

Was	Wann	Wie	Womit	Wer	
	Hygienische Händedesinfektion	vor und nach Bewohnerkontakt vor Verlassen des Zimmers nach Kontakt Toilettenbesuch	Entnahme des Konzentrats, <b>min. 3ml</b> , aus dem Spender. Konzentrat <b>30 Sek.</b> lang in die trockenen Hände einreiben. Die Hände müssen während der gesamten Einwirkzeit durch das konzentrierte Präparat feucht gehalten werden. (beim Verlassen von Isolierbereichen wird eine doppelte Desinfektion der Hände empfohlen.)	<b>Desderman pure gebrauchsfertig min. 3 ml - 30 Sek. EWZ</b>	alle Mitarbeiter / Arzt / Besucher
	Händewaschung (ersetzt nicht die Händedesinfektion ! )	vor Arbeitsbeginn nach Toilettenbenutzung bei sichtbarer Verschmutzung bei Bedarf	Entnahme der Waschlotion aus dem Wandspender unverdünnte Lösung 60 Sek. in den trockenen Händen verreiben, dann mit Wasser aufschäumen, anschließend abspülen und anschließend <b>gut abtrocknen !</b>	<b>Sensiva Waschlotion gebrauchsfertig konzentriert - 60 Sek. EWZ danach mit Leitungswasser abspülen</b>	alle Mitarbeiter / Arzt / Besucher
	Schutzkleidung	bei Betreten des Zimmers anlegen und vor/bei Verlassen des Zimmers ablegen bzw. entsorgen	<b>Einweg-Schutzkleidung</b> im Bewohnerzimmer in den Müllbehälter entsorgen		alle Mitarbeiter / Arzt / Besucher
	Mundschutz		Im Bewohnerzimmer in den Müllbeutel entsorgen.		alle Mitarbeiter / Arzt / Besucher
	Einmalhandschuhe	bei Betreten des Zimmers anlegen und jeweils neue Einmalhandschuhe zur Behandlungspflege	Im Bewohnerzimmer in den Müllbeutel entsorgen.		alle Mitarbeiter / Arzt / Besucher
	Bewohnerwäsche, Bettwäsche	täglich bei Verschmutzung und auf Anweisung bei Bedarf	Im Bewohnerzimmer in den Wäschessammler entsorgen und im geschlossenen Wäschetasche zur Wäscherei transportieren.	<b>gelistetes, desinfizierendes Waschverfahren</b>	Pflegepersonal
	Waschschüssel Waschbecken	1 x täglich	Desinfizierend reinigen.	<b>Terralin protect 2 % - 2 Std. EWZ</b> z.B. 20 ml auf 980 ml Wasser	Pflegepersonal
	Bett / Zubehör Bettgestell Nachtschrank	1 x täglich  nach Verunreinigung mit infektiös. Material	Desinfizierend reinigen.	<b>Terralin protect 2 % - 2 Std. EWZ</b> z.B. 20 ml auf 980 ml Wasser  <b>Mikrozid sensitive wipes Einwirkzeit 15 Minute</b>	Pflegepersonal
	Gerätschaften: Rollstuhl, Gehhilfen Inf.ständer, Toil.stuhl	1 x täglich  nach Verunreinigung mit infektiös. Material	Desinfizierend abwischen.	<b>Terralin protect 2 % - 2 Std. EWZ</b> z.B. 20 ml auf 980 ml Wasser  <b>Mikrozid sensitive wipes Einwirkzeit 15 Minute</b>	Pflegepersonal
	Kontaktflächen: Handläufe, Türgriffe Schalter, Wandspenderhebel	mehrmals täglich  nach Verunreinigung mit infektiös. Material	Desinfizierend abwischen.	<b>Terralin protect 2 % - 2 Std. EWZ</b> z.B. 20 ml auf 980 ml Wasser  <b>Mikrozid sensitive wipes Einwirkzeit 15 Minute</b>	Externe Pflegepersonal

# NOROVIREN

## Hygienemaßnahmen

	Was	Wann	Wie	Womit	Wer
	Abfallbehälter	1 x täglich	Abfallbehälter leeren. Desinfizierend abwischen. Neue Abfalltüte einlegen.	<b>Terralin protect</b> <b>2 % - 2 Std. EWZ</b> z.B. 20 ml auf 980 ml Wasser	Externe / Pflegepersonal
	Sanitärbereich: Dusche, Haltegriffe Toilettenbrille, -deckel,	mehrmals täglich	Desinfizierend abwischen.	<b>Terralin protect</b> <b>2 % - 2 Std. EWZ</b> z.B. 20 ml auf 980 ml Wasser	Externe
	Toilettenbürstengriff, Toilettenstuhl	nach Verunreinigung mit infektiös. Material		<b>Mikroziid sensitive wipes</b> <b>Einwirkzeit 15 Minute</b>	Pflegepersonal
	Flächen, Inventar, Arbeitsflächen,	1 x täglich	Desinfizierend abwischen.	<b>Terralin protect</b> <b>2 % - 2 Std. EWZ</b> z.B. 100 ml auf 4.900 ml Wasser	Externe
	Fußboden	nach Verunreinigung mit infektiös. Material		<b>Mikroziid sensitive wipes</b> <b>Einwirkzeit 15 Minute</b>	Pflegepersonal
	Geschirr, Besteck	sofort nach Benutzung	Im geschlossenen und entsprechend gekennzeichneten Behältnis zur Spülküche transportieren und mit Einmalhandschuhen in die Spülmaschine eingesortieren. Einlegeverfahren	einem desinfizierenden Spülverfahren zuführen	Stationshilfe / Pflegepersonal
	Reinigungstextilien	sofort nach Gebrauch	Im geschlossenen und entsprechend gekennzeichneten Behältnis zur Wäscherei transportieren.	<b>gelistetes, desinfizierendes Waschverfahren</b>	Pflegepersonal
	Schlussdesinfektion	nach Freiwerden des Zimmers	Gründlich desinfizierend reinigen.	<b>Perform</b> <b>40 gr. ( 1 Beutel ) auf</b> <b>1 ltr. Wasser - 4 Std. EWZ</b>	Externe



## HINWEISE

Händewaschen:	Bei sichtbarer oder vermuteter Kontamination der Hände oder der Haut wird - abweichend vom üblichen Procedere - eine intensive Reinigung / Waschung der Hände / Haut empfohlen.
Schmuckstücke, Armbanduhren:	Dürfen beim Arbeiten nicht getragen werden ( gilt auch für ähnliche Gegenstände, wenn sie zu einer Gefährdung von Personal oder Bewohner / Patient führen können )
Schutzhandschuhe	Dünnwandige und flüssigkeitsdichte Handschuhe sind zu tragen, wenn die Hände mit Ausscheidungen oder infektiösem Material in Berührung kommen können ( dies gilt auch für nicht direkt sichtbare Verschmutzungen dieser Art ).
Schutzkleidung:	Ist täglich und bei sichtbarer Kontamination sofort zu wechseln.
Medizin. Geräte,	Sind im Zimmer zu belassen.
Pflegehilfsmittel,	
Putzutensilien:	
Desinfektions- mittellösung:	Sind mit kaltem Wasser anzusetzen und täglich zu erneuern.
Einlegeverfahren:	Bei grober Verschmutzung / Kontamination mit Stuhl / Erbrochenem ist eine Aufbereitung im Einlegeverfahren ( in einem zu verschließenden Behältnis ) möglich.

Freigabe, Datum: 20.08.2024

Mitarbeiter: Kreutzer

Unterschrift: \_\_\_\_\_

Die Überprüfung auf Vollständigkeit und Richtigkeit hinsichtlich des Desinfektionsplans sowie der eingeleiteten Maßnahmen liegt beim Anwender !

fertige Lösung	0,50 %	1 %	2 %
1 L	5 ml / 995 ml	10 ml / 990 ml	20 ml / 980 ml
5 L	25 ml / 4.975 ml	50 ml / 4.950 ml	100 ml / 4.900 ml